



Samenvatting

Deze procedure beschrijft hoe een nasopharyngeaal aspiraat dient afgenomen te worden bij een patiënt.

Doelstelling

Correcte en veilige afname van een nasopharyngeaal aspiraat bij de patiënt

Toepassingsgebied

Indicatie:

ter opsporing van de aanwezigheid van bepaalde virussen zoals bijvoorbeeld influenza (seizoensgriep) en RSV (respiratoir syncytiaal virus). Bij correcte afname is de gevoeligheid (kans op detectie) hoger dan bij afname met een wisser.

Tegenindicatie:

geen, tenzij anders aangegeven door de behandelende arts

Definities en gebruikte afkortingen

NPA: nasopharyngeaal aspiraat

NFA: nasofaryngeaal aspiraat

Procedure

Benodigdheden:

- Aspirator (op afdeling aanwezig, wordt ook gebruikt om slijmen te aspireren, gebruik een tussenstuk)
- Aspiratiesonde met recipiënt (SAP code 5608)
- Vers flesje steriel fysiologisch water
- Handschoenen
- Mondmasker
- Papieren zakdoek voor de patiënt

Aandachtspunten:

- Leg steeds goed uit aan de patiënt wat je zal doen
- Om aspiratietoestel en aspiratiesonde op elkaar aan te sluiten kan het noodzakelijk zijn om een stuk van de tip van het tussenstuk af te knippen (past anders niet)
- Zorg voor je persoonlijke bescherming:
 - o altijd handhygiëne (voor en na afname)
 - o handschoenen
 - o masker (patiënt kan hoesten of niezen door afname)

Afname:

- Ontsmet de handen
- Draag mondmasker en handschoenen



- Geef aan de patiënt een zakdoek, te gebruiken bij hoesten/niezen. Niet snuiten tot de afname voltooid is.
- De sonde ver genoeg via de neus opschuiven tot aan de nasopharynx (overgang neus-keel) en aspireer secreties
 - Tip: breng de sonde eerder horizontaal naar achter voorbij de neusschelpen in (niet naar boven toe)
- Aspireer (voldoende) staal (je ziet secreties door de tube lopen)
 - Opmerking: soms is enig geduld vereist (prikkeling van de slijmvliezen veroorzaakt productie van neussecreten). Indien er geen materiaal meekomt (zelden) kan het noodzakelijk zijn om fysiologisch in de neus te brengen (diep genoeg) en te aspireren
- Spoel de afnameset na met fysiologisch water tot een totaal volume van maximum ± 2 ml
- Bij een goede afname zie je duidelijk vlokjes en/of slijmen aanwezig in het fysiologisch
- Verwijder het bovenste kapje. De dop om af te sluiten vind je onderaan, vast op de bodem van het recipiënt.
- Verwijder de handschoenen en ontsmet de handen.
- Breng patiëntidentificatie (klever) aan op het recipiënt en breng het staal naar het lab samen met een aanvraag.



Indicatoren

Geen

Opmerkingen en bijzonderheden

Geen

Referenties

Niet van toepassing

Verwante documenten, bijlagen, hulpmiddelen

Niet van toepassing